

FINALIDAD

Esta prueba se solicita para detectar la presencia de antígeno de dos de los virus que más frecuentemente producen diarrea y síntomas digestivos en niños y adultos jóvenes.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

De forma general no precisa ninguna preparación, salvo que el médico que prescriba la prueba indique lo contrario.

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA

Necesitará un frasco de cierre hermético para recogida de heces, de venta en farmacias.

La deposición debe realizarse sobre un recipiente de boca ancha tipo orinal o cuña. No es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio y bien aclarado (no deberá contener restos de jabones, detergentes ni desinfectantes).

Transfiera, cuidadosamente una cantidad de heces equivalente al tamaño de 2 nueces, si la deposición es sólida; si la deposición es líquida no llene más de la mitad del bote de recogida.

Evite la contaminación con orina, papel higiénico, agua, etc.

Procure llevar la muestra al laboratorio lo antes posible, mientras tanto, puede conservar la muestra a temperatura ambiente.

TIEMPO DE RESPUESTA O RESULTADO

2 días

Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email atencionalpaciente@analizalab.com o en el teléfono 902 67 64 57.