

### **FINALIDAD**

Esta prueba se solicita para detectar infección activa por Helicobacter Pylori y comprobar si el tratamiento ha sido efectivo.

### **PREPARACIÓN**

- Durante el mes anterior al test **no tomar** tratamiento antibiótico, previa consulta a su médico.
- Durante los 15 días previos **no tomar omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol** u otro inhibidor de la bomba de protones o con sales de bismuto, siempre consultando previamente a su médico.
- Sí podrá tomar antiácidos tipo almagato, bicarbonato de sodio, hidróxido de magnesio, etc.

### **INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE MUESTRA**

Necesitará un frasco de cierre hermético para recogida de heces, de venta en farmacias. Evite la contaminación con orina, papel higiénico, agua, etc. y deposite en el recipiente una cantidad de heces equivalente al tamaño de una nuez.

Procure llevar la muestra al laboratorio lo antes posible, mientras tanto, puede conservar la muestra en la nevera (entre 2º y 8º grados), **no congelar**.

### **TIEMPO DE RESPUESTA O RESULTADO**

72 horas

Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email [atencionalpaciente@analizalab.com](mailto:atencionalpaciente@analizalab.com) o en el teléfono 902 67 64 57.

