

PROPÓSITO:

Avaliar a capacidade fecundante do esperma após a vasectomia realizada.

PREPARAÇÃO

- **Habitualmente recolhem-se duas amostras após a vasectomia, mas deverá seguir as recomendações do seu médico.**
- Nunca recolher Esperma se não tiverem passado 3 a 4 meses após a vasectomia e um mínimo de 25 ejaculações.
- Para recolher a Segunda amostra de Esperma após a vasectomia, deverá esperar-se 1 mês depois do resultado do primeiro Espermograma Pós vasectomia.
- Manter uma abstinência mínima de 2 dias e máxima de 7 dias.
- Não recolher a amostra se tiver apresentado febre ou doença nos 7 dias anteriores.

INSTRUÇÕES DE COLHEITA DE AMOSTRA

- Esvaziar a bexiga antes de recolher o esperma.
- Lavar as mãos e os genitais com sabão, enxaguando muito bem com água.
- Obter o esperma por masturbação, recolhendo **a totalidade** da amostra.
- Não usar preservativos para recolher a amostra.
- Recolher a amostra num recipiente estéril de plástico de boca larga.
- Proteger o esperma da luz, do frio e do calor intenso. Tentar transportá-lo perto do corpo para mantê-lo à temperatura adequada (o mais próximo dos 36º C, que é a temperatura corporal habitual).
- A amostra deve ser entregue na consulta de colheitas do hospital preferencialmente antes de 1 hora desde a sua colheita e nunca depois de 2 horas.

TEMPO DE RESPOSTA

48 horas

Para qualquer consulta adicional não hesite em contactar a Analiza por e-mail paraatencionalpaciente@analizalab.com ou por telefone para 902 67 64 57.