

### **PROPÓSITO**

Este teste é solicitado para detetar a presença de Toxinas A/B produzidas pela Bactéria Clostridium Difficile, que podem causar diarreia após a toma de Antibióticos.

### **PREPARAÇÃO DO PACIENTE**

De forma general não precisa de qualquer preparação, exceto se o médico que lhe prescrever o teste lhe indicar o contrário.

### **INSTRUÇÕES DE COLHEITA**

Necessitará de um frasco de fecho hermético para recolha de fezes, à venda em farmácias.

A dejeção deverá ser realizada sobre um recipiente de boca larga tipo bacio ou coletor em cunha. Não é necessário estar esterilizado, basta estar limpo e bem enxaguado (não deverá conter resíduos de sabão, detergentes nem desinfetantes).

Transfira cuidadosamente uma quantidade de fezes equivalente ao tamanho de 2 nozes, se a dejeção for sólida; se a dejeção for líquida, não encha mais de metade do recipiente de recolha.

- Evite a contaminação com urina, papel higiénico, água, etc.
- Tente levar a amostra para o laboratório o mais depressa possível e, entretanto, pode conservar a amostra à temperatura ambiente.

### **TEMPO DE RESPOSTA OU RESULTADO**

2 dias.

Para qualquer consulta adicional não hesite em contactar a Analiza por e-mail para [atencionalpaciente@analizalab.com](mailto:atencionalpaciente@analizalab.com) ou por telefone para 902 67 64 57.